

TYLENOL® Dosificación fácil

REGULAR STRENGTH: Alivio potente y rápido del dolor y de la fiebre

Geles líquidos y tabletas TYLENOL® Regular Strength



Use los productos solo como se indica.

INGREDIENTE ACTIVO	DOSIS Y FRECUENCIA*	INSTRUCCIONES
Acetaminofén 325 mg (en cada gel líquido/tableta)	Adultos y niños de 12 años en adelante: Tomar 2 geles líquidos/tabletas cada 4 a 6 horas mientras duren los síntomas Niños de 6 a 12 años: Tomar 1 gel líquido/tableta cada 4 a 6 horas mientras duren los síntomas	Adultos: No tomar más de 10 geles líquidos/tabletas en 24 horas, a menos que lo indique un profesional de la salud Niños: No tomar más de 5 geles líquidos/tabletas en 24 horas

*Para niños menores de 6 años, consulte a un profesional de la salud.

EXTRA STRENGTH: Alivio potente y rápido del dolor y de la fiebre

Comprimidos recubiertos con forma de cápsula, comprimidos recubiertos, geles de liberación rápida y paquetes para disolver de TYLENOL® Extra Strength



Use los productos solo como se indica.

INGREDIENTE ACTIVO	DOSIS Y FRECUENCIA†	INSTRUCCIONES
Acetaminofén 500 mg (en cada comprimido recubierto/tableta/polvo/cápsula)	Tome 2 comprimidos recubiertos/tabletas/cápsulas/polvos cada 6 horas mientras duren los síntomas	No tome más de 6 comprimidos recubiertos/tabletas/cápsulas/polvos en 24 horas, a menos que lo indique un profesional de la salud

†Para niños menores de 12 años, consulte a un profesional de la salud.

LIBERACIÓN PROLONGADA: Alivio rápido para dolores musculares y dolores menores causados por la artritis, que dura hasta 8 horas

Tabletas TYLENOL® 8HR Arthritis Pain‡ y tabletas TYLENOL® 8HR Muscle Aches & Pain§



Use los productos solo como se indica.

INGREDIENTE ACTIVO	DOSIS Y FRECUENCIA	INSTRUCCIONES
Acetaminofén 650 mg (en cada tableta)	Tomar 2 tabletas cada 8 horas, con agua	No tome más de 6 tabletas en 24 horas

‡Para niños menores de 18 años, consulte a un profesional de la salud. §No usar en niños menores de 12 años. ||Liberación prolongada.

PM EXTRA STRENGTH: Alivia dolores y molestias menores mientras ayuda a conciliar el sueño

Comprimidos recubiertos TYLENOL® PM Extra Strength§



Use el producto solo como se indica.

INGREDIENTE ACTIVO	DOSIS Y FRECUENCIA	INSTRUCCIONES
Acetaminofén 500 mg Difenhidramina HCl 25 mg (en cada comprimido recubierto)	Tomar 2 comprimidos recubiertos antes de irse a dormir	No tome más de 2 comprimidos recubiertos en 24 horas

§No usar en niños menores de 12 años.

Esta no es una lista completa de todos los productos de TYLENOL®.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL USO ADECUADO:

- Lea y siga siempre las instrucciones de la etiqueta en todos los productos de TYLENOL®
- **NO** use con ningún otro producto que contenga acetaminofén
- Espere el tiempo indicado entre dosis
- Si tiene alguna pregunta, consulte con un profesional de la salud para saber qué producto es adecuado para usted

Para obtener información adicional sobre el producto, visite Tylenol.com

